

1.

### Ovarielle Stimulation

Ab dem zweiten Tag der Regelblutung wird mit der Hormonbehandlung (10–12 Tage) begonnen und Ultraschallkontrollen vorgenommen.

2.

### Insemination

Wird 36–38 Stunden nach der letzten Hormoninjektion vorgenommen.

3.

### Spendersamen

Im Labor wird der Spendersamen vorbereitet (und aufgetaut).

4.

### Befruchtung

Der Befruchtungsprozess erfolgt in der Praxis im Gynäkologiestuhl. Mit einer Kanüle werden die ausgewählten Spermien in die Gebärmutter eingebracht. Das Verfahren ist schmerzfrei und danach ruht die Frau 20 Minuten lang.

5.


### Progesteron

Bis zur 12. Schwangerschaftswoche wird jeden Abend ein Progesteron-Vaginalzäpfchen verabreicht.

6.

### Schwangerschaftstest

14 Tage später wird ein Schwangerschaftstest gemacht.



## Para quien está recomendado

- **Mujeres jóvenes, con buena reserva ovárica y que tengan una pareja con muy mala calidad de semen**
- **Mujeres que no tengan pareja masculina**
- **Parejas donde el varón tenga alguna enfermedad que no se quiera transmitir al embrión.**